



Presbyacousie ?

La Presbyacousie apparaît généralement vers la cinquantaine de façon progressive et insidieuse, le sujet atteint n'a pas conscience de la dégradation de son audition. En fait elle commence dès l'âge de 20 ans !!!

Comment repérer une personne malentendante ?

- Elle vous entend mais se plaint de ne pas comprendre.
- Elle n'entend pas la sonnerie du téléphone.
- Elle hausse le son de la télévision...
- Elle vous fait souvent répéter...



© Phoenix - Fotolia

Quelques conseils pour s'adresser à elle

- Parler à voix haute, distincte, avec un débit régulier et calme... mais sans crier !
- Placez-vous de face, de façon à avoir le visage bien éclairé afin de rendre la lecture labiale plus aisée.
- Si le message n'a pas été compris, n'hésitez pas à le répéter ou à le dire autrement.
- Au besoin, vous pouvez utiliser l'écrit, des mimiques, des gestes...

Ne pas laisser planer le doute ni l'incertitude !!!

Entretien régulier des appareils

- Pensez à mettre systématiquement les appareils, à les nettoyer.
- Vérifier et changer les piles.
- Faire contrôler les réglages par l'audioprothésiste (au moins deux fois par an).

Les aides techniques

- Le téléphone à grosses touches avec amplificateur.
- Le télétexte permettant aux résidents malentendants de regarder la TV.
- La boucle magnétique qui permet de suivre une conférence, un spectacle... Facile à installer dans les différents lieux de vie (cet équipement collectif et convivial est à envisager avec un audioprothésiste).



© Justin Paget - Fotolia

**Il n'est jamais trop tôt pour prendre en charge la presbyacousie !
Alors n'hésitez pas à conseiller un bilan auditif auprès d'un médecin ORL.**

En fonction des résultats

- **L'audioprothésiste** proposera l'appareillage et son suivi.
- **L'orthophoniste** se chargera de l'aide au maintien de la communication (entraînement auditif, discrimination des sons, lecture labiale ...).